

# MELOXIMAX® 1



## GRUPO FARMACOLÓGICO

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE)  
Derivado del ácido enólico (Oxicams)

## FORMA FARMACÉUTICA

Tableta

## FÓRMULA

Cada tableta contiene:

Meloxicam .....1 mg  
Excipiente c.b.p .....1 tableta



### 1. Indicaciones de uso

Indicado en perros y gatos para tratar el dolor, inflamación y fiebre en procesos músculo esqueléticos agudos y crónicos, en procesos infecciosos (siempre que se acompañe de la terapia antimicrobiana adecuada). Útil antes y después de la realización de procedimientos quirúrgicos.

### 2. Especie destino

Perros y gatos.

### 3. Posología y vía de administración

Perros y gatos: 0.1 mg/kg cada 24 horas. (1 tableta por cada 10 kg de peso), vía oral.

### 4. Mecanismo de acción

Meloximax® 1 es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), del grupo oxicam, potente inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos. Reduce la infiltración de leucocitos hacia el tejido inflamado. También inhibe, pero en menor grado, la agregación plaquetaria inducida por colágeno. Los estudios in vitro e in vivo demuestran que meloxicam inhibe la ciclooxigenasa 2 (COX-2) en mayor medida que la ciclooxigenasa 1 (COX-1) y se emplea en el tratamiento de la inflamación aguda y crónica asociada en las enfermedades musculoesqueléticas y en el tratamiento del dolor postoperatorio.

### 5. Reacciones adversas

Pueden presentarse problemas gastrointestinales, como vómitos, heces blandas, diarrea e inapetencia. Puede presentarse toxicidad renal (poco frecuente).

### 6. Seguridad

Administrando AINE's se pueden presentar signos gastrointestinales y renales. La toxicidad gastrointestinal es la más reportada en perros, con signos como diarrea y vómito a dosis de 0.1-0.3 mg/kg. En estudios se han reportado cambios microscópicos como degeneración y necrosis de la papila renal, a dosis de 0.5 mg/kg.

### 7. Contraindicaciones

Contraindicado el uso en animales con hipersensibilidad a la fórmula.

Contraindicado su uso en animales con trastornos gastrointestinales (úlceras), así como en animales con deterioro de la función hepática, cardíaca, renal y trastornos hemorrágicos.

### 8. Advertencias y precauciones de uso

En caso de anafilaxia administrar epinefrina o corticoesteroides de forma parenteral.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No se ha evaluado su uso en animales menores a 6 meses de edad, ni gatos menores a 4 meses.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Lávese las manos después de haber medicado al paciente.

### 9. Tiempo de retiro

N/A

### 10. Interacciones con otros medicamentos

El uso concomitante con otros AINE's puede potenciar la ulcerogenicidad de estos en tratamientos prolongados.

Administrar AINE's y corticoides en conjunto, puede aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal.

El uso concomitante con anticoagulantes, puede aumentar las posibilidades de hemorragia.

Los AINE's pueden reducir los efectos saluréticos y diuréticos.

# MELOXIMAX® 1

---



## 11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 24 meses a partir de su fecha de elaboración.

## 12. Precauciones especiales de conservación

Manténgase en un lugar fresco y seco.  
Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.  
Protéjase de la luz solar directa.

## 13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura.

## PRESENTACIÓN (ES)

Caja con 30 tabletas.