

# BACTERINA TRIPLE BOVINA



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bacterina múltiple inactivada

## FORMA FÍSICA

Suspensión inyectable

## FÓRMULA

*Clostridium chauvoei*

*Clostridium septicum*

*Pasteurella multocida* tipos A y D

*Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica* A1)



### 1. Indicaciones de uso

Bacterina Triple Bovina está indicada en la prevención de carbón sintomático, edema maligno, fiebre de embarque y pasteurelosis.

### 2. Especie destino

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

### 3. Dosis y vía de administración

Equinos y bovinos 5 mL, ovinos y caprinos 2.5 mL. Vía intramuscular o subcutánea.

### 4. Reacciones adversas

Pueden aparecer reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

### 5. Seguridad

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o antihistamínicos.

### 6. Contraindicaciones

No administrarse en animales enfermos o inmunocomprometidos.

### 7. Advertencias y precauciones de uso

Aplicarse únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

### 8. Tiempo o periodo de retiro

No utilizar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

### 9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

### 10. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.

### 11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

## PRESENTACIÓN (ES)

10 dosis (50 mL), 20 dosis (100 mL) y 50 dosis (250 mL).