BIOARSENOL VITAMINADO

Registro SAGARPA Q-0104-173

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hematopoyético

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA
Solución inyectable

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Monometilarseniato de sodio..... 3.5 g
Glicerofosfato de sodio..... 8.5 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina)..... 1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)..... 100 mg
Vehículo c.b.p..... 100 mL

1. Indicaciones de uso
Bioarsenol vitaminado® es un tónico hematopoyético. Indicado en casos de anemia, raquitismo, debilidad muscular, agotamiento por hemorragias y convalecencias, enfermedades infecciosas o parasitarias. Por acción de las vitaminas del Complejo B, estimula el apetito, activa la formación de glóbulos rojos y coadyuva en las deficiencias vitamínicas. Útil en animales en los que se requiere gran esfuerzo como en los caballos de carreras, hembras con numerosas crías y en ganado de alta producción lechera.

2. Especie destino
Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

3. Posología y vía de administración
Bovinos y equinos: 10 mL
Ovinos y caprinos: 2 mL
Porcinos: 3.5 mL
Caninos: 1 mL
Felinos: 0.1-0.2 mL
Vía de administración intramuscular o intravenosa lenta.

4. Mecanismo de acción
Bioarsenol vitaminado® ejerce un efecto fortificante por su acción sobre el metabolismo corporal, desencadenando: un aumento en el anabolismo y una desasimilación retardada, lo que ocasiona un aumento en el consumo de alimento y un estado nutritivo equilibrado. Por sus efectos sobre el metabolismo corporal al incrementar los procesos anabólicos y por consiguiente la asimilación de los nutrientes, permite: una mejor formación del sistema óseo en elaboración constante (crecimiento) o en estados que aceleren la resorción (gestación y lactación), estimular la producción de eritrocitos en la médula ósea, mejorar el aspecto general en el pelaje y reforzar el estado general en el animal durante el crecimiento, desarrollo, producción, estado infeccioso o parasitario, y durante la convalecencia.

5. Reacciones adversas
Pueden presentarse de hipersensibilidad. Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina y/o corticoides.

6. Seguridad
No produce enfermedad ni reacciones adversas atribuibles al producto.

7. Contraindicaciones
Si la vía de administración es intravenosa, asegurarse que sea lenta.

8. Advertencias y precauciones de uso
No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.
Conservar fuere del alcance de los niños y animales domésticos.

9. Tiempo o periodo de retiro
En carne: 5 días antes del sacrifico de los animales destinados para consumo humano
Sin tiempo del retiro en leche.

10. Interacciones con otros medicamentos
N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final
Caducidad 2 años a partir de la fecha de elaboración

12. Precauciones especiales de conservación
Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.
Protéjase de la luz solar directa. Conservar fuera del alcance de niños y animales domésticos.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos
Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura, según la normativa vigente aplicable a su país.

PRESENTACIÓN(ES) FARMACÉUTICA(AS)
Frasco con 50 mL, 100 mL y 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. VENTA SUJETA A PREESCRIPCIÓN MÉDICA.
ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA POR EL MÉDICO VETERINARIO.