

Bacterina Biobac[®] 7 Vías

Número de registro B-0104-101

Descripción del producto

Vacuna inactivada múltiple de origen bacteriano.

Forma física o farmacéutica

Suspensión inyectable

Fórmula

Cada mL antes de inactivar contiene:

<i>Clostridium chauvoei</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium septicum</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium novyi</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordellii</i>	1 x 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C.....	1 x 10 ⁸ UFC
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D	1 x 10 ⁸ UFC
Adsorbidas en hidróxido de aluminio	0.25 %



1. Indicaciones de uso

Bacterina Biobac[®] 7 vías está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa y enterotoxemias, causadas por los microorganismos contenidos en la fórmula.

Se recomienda la vacunación inicial: entre 2 y 3 meses de edad

Refuerzo: 3 – 4 semanas después de la primera dosis.

Revacunación en animales adultos: cada 6 a 12 meses.

2. Especie destino

Bovinos, ovinos y caprinos de engorda y productores de leche.

3. Dosis y vía de administración

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea

Bovinos: 5 mL.

Ovinos y caprinos: 2.5 mL.

4. Reacciones adversas

Pueden presentarse reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el sitio de aplicación, o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

5. Seguridad

Se puede utilizar en hembras gestantes.

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o corticoides.

6. Contraindicaciones

No aplicar a animales inmunodeprimidos, enfermos y/o en crías menores de 8 semanas de edad.

7. Advertencias y precauciones de uso

Agitar antes de usar.

Aplicar únicamente en animales sanos.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

8. Tiempo o periodo de retiro

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

18 meses a partir de la fecha de inactivación y mezclado.

10. Precauciones especiales de conservación

Conservar en refrigeración entre 2°C y 8° C.

Evitar la congelación y la exposición a la luz solar directa.

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

Presentación (es)

Frasco con 10 dosis (50 mL) y 50 dosis (250 mL).