



BACTERINA BIOBAC 11 VÍAS

Registro SAGARPA B-0104-092

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bacterina múltiple inactivada

FORMA FÍSICA

Suspensión inyectable

FÓRMULA

Clostridium chauvoei

Clostridium septicum

Clostridium novyi

Clostridium sordellii

Clostridium perfringens tipo C

Clostridium perfringens tipo D

Pasteurella multocida tipo A

Pasteurella multocida tipo D

Mannheimia haemolytica serotipo A1

Histophilus somni (*Haemophilus somnus*)



1. Indicaciones de uso

BACTERINA BIOBAC® 11 VÍAS está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis, pasteurelosis, infecciones por *Mannheimia haemolytica* e *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*).

2. Especie destino

Bovinos, ovinos y caprinos.

3. Dosis y vía de administración

Bovinos 5 mL, ovinos y caprinos 2.5 mL. Vía Intramuscular o subcutánea.

4. Reacciones adversas

Pueden aparecer reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

5. Seguridad

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o antihistamínicos.

6. Contraindicaciones

No aplicar a animales inmunodeprimidos, enfermos y/o crías menores a 8 semanas de edad.

7. Advertencias y precauciones de uso

Aplíquese únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

8. Tiempo o periodo de retiro

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No hay periodo de retiro en leche.

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

10. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa. Agite antes de usar.

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Desechar el envase de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN (ES)

10 dosis (50 mL), 20 dosis (100 mL) y 50 dosis (250 mL).