

BIOMISÁN

Registro SAGARPA Q-0104-141



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Antiinflamatorio

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA

Ungüento

FÓRMULA

Cada 100 g contienen:

| | |
|----------------------------|--------|
| Aceite de Eucalipto..... | 2.72 g |
| Esencia de trementina..... | 5.20 g |
| Salicilato de metilo..... | 2.95 g |
| Extracto de árnica..... | 0.92 g |
| Extracto de algas..... | 4.60 g |
| Extracto de romero..... | 4.60 g |
| Vehículo c.b.p..... | 100 g |



1. Indicaciones de uso

Biomisán tiene acción analgésica, antiflogística, astringente, rubefaciente y antiséptica; auxiliar para el tratamiento de inflamaciones, abscesos, golpes, procesos inflamatorios de la ubre, torceduras, esguinces traumatismos, lesiones osteomusculares, osteoartíticas y procesos reumáticos para todas las especies.

2. Especie destino

Bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos.

3. Posología y vía de administración

Realizar una previa limpieza de la zona afectada. Aplique libremente dando un suave masaje en forma envolvente para permitir una mejor penetración de los ingredientes. Repetir la operación cada 24 hrs hasta la completa recuperación.

4. Mecanismo de acción

Biomisán se emplea especialmente en todas las afecciones inflamatorias, principalmente en aquellas de la glándula mamaria; aumenta la circulación, lo cual lo hace un excelente coadyuvante en el tratamiento de las mastitis y del edema posparto.

El efecto desinfectante de Biomisán además de bactericida y analgésico, ayuda al proceso curativo de heridas y úlceras, mejorando la cicatrización. En los procesos artríticos, reumáticos y otras afecciones de las articulaciones, la aplicación de Biomisán contrarresta el proceso inflamatorio (acción antiflogística) logrando recuperar la movilidad rápidamente. Los esguinces, distensiones tendinosas y contusiones se resuelven satisfactoriamente con el empleo de Biomisán.

5. Reacciones adversas

N/A

6. Seguridad

N/A

7. Contraindicaciones

N/A

8. Advertencias y precauciones de uso

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

9. Tiempo o periodo de retiro

N/A

10. Interacciones con otros medicamentos

N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final s

3 años a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C. Protéjase de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN(ES) FARMACÉUTICA(AS)

Frasco con 200 g.