

Descripción del producto

Antibacteriano de amplio espectro

Forma física o farmacéutica

Suspensión inyectable

Fórmula

Cada 100 mL contienen

Enrofloxacin	12.0 g
Vehículo c.b.p	100 mL



1. Indicaciones de uso

Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, genitourinarias y de piel causadas por microorganismos sensibles a la enrofloxacin como *Escherichia coli*, *Pasteurella sp*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Mycoplasma sp*, *Clostridium spp.*, entre otros.

2. Especie destino

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos , caprinos, caninos, felinos y conejos.

3. Dosis y vía de administración

Bovinos, equinos y porcinos: 2.5 mg/kg de peso (1 mL/50 kg) cada 24 horas.

Ovinos, caprinos, caninos, felinos y conejos: 5 mg/kg de peso (1 mL/25 kg) cada 24 horas.

Administrar durante 3 a 8 días o a criterio del médico veterinario.

Vía de administración intramuscular o intravenosa

4. Mecanismo de acción

La enrofloxacin y su metabolito activo (ciprofloxacina) actúan como bactericidas porque inhiben la girasa de DNA (topoisomerasa II) y evitan la duplicación bacteriana; la respiración y la división celular se detienen, se interrumpen procesos celulares y se altera la integridad de la membrana. La girasa de DNA de animales superiores y mamíferos no es afectada por las fluoroquinolonas. La enrofloxacin es bactericida con el doble de CMI.

5. Reacciones adversas

En tiempos prolongados de administración puede ocasionar gastritis.

Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.

6. Seguridad

N/A

7. Contraindicaciones

No se recomienda su uso en animales jóvenes en desarrollo, ya que puede producir lesiones en los cartílagos.

8. Advertencias y precauciones de uso

No administrar más de 6 mL en bovinos y más de 1.5 mL en cerdos, en el mismo sitio de aplicación.

En caso de reacción anafiláctica aplicar epinefrina y terapia de soporte.

No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

9. Tiempo de retiro

No administra este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

No utilizar para consumo o para la fabricación de derivados de la leche de los animales tratados con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación

10. Interacciones con otros medicamentos

No utilizar juntamente con cloranfenicol, tetraciclinas rifampicina, teofilina, analgésicos no esteroideos y/o cafeína, ya que ocurre antagonismo.

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

El producto cuenta con un periodo de 2 años a partir de su fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Conservar en un lugar fresco y seco a temperatura entre 10°C y 30°C.

Proteger de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región .

Presentación (es)

Frasco con 20 mL, 50 mL y 250 mL