

Descripción del producto

Antiparasitario

Forma física o farmacéutica

Solución inyectable

Fórmula

Cada 100 mL contienen

Abamectina

1.0 g

Vehículo c.b.p

100 mL



1. Indicaciones de uso

Indicado para el tratamiento y control de parásitos internos gastrointestinales y pulmonares, así como el control de algunos parásitos externos.

2. Especie destino

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

3. Dosis y vía de administración

Bovinos, ovinos y caprinos: 200 mcg por kg de peso, (1 mL/50 kg).

Porcinos: 300 mcg por kg de peso, (1 mL/33 kg)

Dosis única. Repetir a los 60 días a criterio del médico veterinario.

Vía de administración subcutánea exclusivamente.

4. Mecanismo de acción

En parásitos redondos (nematodos) y artrópodos, la abamectina actúa estimulando la potencialización del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) en las terminaciones nerviosas, impidiendo la transmisión muscular, provocando la parálisis y muerte del parásito. La abamectina se absorbe totalmente en el sitio de aplicación y se distribuye en todo el organismo. Los niveles terapéuticos se mantienen durante dos semanas, aparentemente sin sufrir biotransformación considerable. Se excreta por vía renal, fecal (principal vía de eliminación) y por leche.

5. Reacciones adversas

Se puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina y/o corticoides.

6. Seguridad

La dosis tóxica para las avermectinas es de $2 > 8$ mg/kg de peso.

Los signos clínicos típicos de intoxicación aguda por avermectinas son; letargia, ataxia (descoordinación de movimientos), temblores, salivación midriasis. En general las intoxicaciones afectan sobre todo al sistema nervioso central.

7. Contraindicaciones

Contraindicado en crías menores a los 4 meses de edad.

Tras administración subcutánea pueden darse hinchazón en el lugar de la inyección.

No usar vía intramuscular o intravenosa.

8. Advertencias y precauciones de uso

Dosificar siempre en relación con el peso.

Utilizar con precaución en animales estresados o débiles.

No aplicar en vacas en periodo de lactación cuya leche sea destinada para consumo humano.

Los animales jóvenes son más susceptibles a la intoxicación por las lactonas, las reacciones son más potentes y el pronóstico es peor que en animales adultos.

Puede ser aplicado en cualquier etapa de gestación.

9. Tiempo de retiro

Carne: No utilizar este producto 42 días antes del sacrificio de animales destinados para el consumo humano.

Leche: No autorizado.

10. Interacciones con otros medicamentos

Se aconseja tener cuidado si se utilizan otras drogas que puedan inhibir la glicoproteína P, como las siguientes drogas: amiodarona, carvedilol, claritromicina, cilcosporina, diltiazem, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, quinidina, espironolactona, tamoxifeno, verapamilo .

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Almacenar a temperatura entre 10°C y 30°C en un lugar fresco y seco.

Protéjase de la luz solar directa.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Dado que las avermectinas tienen efecto sobre algunas especies acuáticas, tomar precauciones para evitar la contaminación de cuerpos de agua. Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura, según la normativa vigente aplicable a su país.

Presentación (es)

Frasco con 50 mL y 500 mL.