

Descripción del producto

Combinación antibiótica.

Forma física o farmacéutica

Solución inyectable.

Fórmula

Cada 100 mL contienen

Sulfadoxina	20 g
Trimetoprim	4 g
Vehículo c.b.p.	100 mL

1. Indicaciones

Gorbazoo® está indicado en equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos, en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a los componentes de la fórmula.

2. Especies destino

Equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.

3. Dosis y vía de administración

Vía de administración: Intramuscular, intravenosa lenta o subcutánea.

Dosis: 15 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs, durante 3 a 5 días o a criterio del médico veterinario.

Dosis práctica: 1.5 mL/20 kg

4. Mecanismo de acción

La vida media de eliminación de la sulfadoxina es de casi 10 h en el perro, 2 3/4 h en el caballo, 2 1/2 h en los bovinos. La vida media de eliminación de la sulfadoxina va de 5.7 a 3.6 h en los mismos periodos, y el trimetoprim se elimina en las semanas mencionadas con una T1/2 de 8.4 h que se reduce a tan sólo 0.9 h en la sexta semana. La acidificación de la orina favorece la eliminación del trimetoprim, pero también la cristalización de las sulfas, particularmente cuando aquél está combinado con sulfadoxina. Su relación pKa/pH no favorece su entrada a la glándula mamaria. Sin embargo, tiene buena distribución hacia los líquidos peritoneal, cefalorraquídeo y sinovial y orina. Es muy común encontrar la sulfadoxina potencializada con trimetoprim en una proporción 1:5, la cual ha resultado útil para el tratamiento de infecciones provocadas por *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp., *Corynebacterium* sp., *Bordetella* sp., *Clostridium* sp., y microorganismos gramnegativos como *Proteus* sp., *Salmonella* sp., *Pasteurella* sp. Y *Klebsiella* sp. Por ello se le recomienda para infecciones de las vías respiratorias del tubo digestivo y de las vías urinarias. Se le usa con mucho éxito para coccidiosis en perros y gatos.



5. Reacciones adversas

Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.

6. Seguridad

N/A

7. Contraindicaciones

No utilizar en animales con insuficiencia renal

No aplicar en animales que presenten hipersensibilidad a las sulfonamidas.

8. Advertencias y precauciones de uso

Durante el tratamiento debe procurarse que el animal beba suficiente agua.

No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

9. Tiempo o periodo de retiro

No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación.

10. Interacciones con otros medicamentos

N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración

12. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Guardar a temperatura entre 10 °C y 30 °C.

Proteger de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Una vez utilizado deseche de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

Presentación (es)

Frasco con 30 mL, 100 mL y 250 mL