



## Descripción del producto

Biológico múltiple de origen viral.

## Forma física o farmacéutica

Pastilla liofilizada más diluyente.

## Fórmula

### Pastilla liofilizada de virus activo modificado

Contenido mínimo de título de cada fracción en 1 mL

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Parvovirus canino, cepa Cornell   | $10^{3.0}$ a $10^{5.0}$ DICT <sub>50%</sub> |
| Distemper canino, cepa Lederle    | $10^{3.0}$ a $10^{5.0}$ DICT <sub>50%</sub> |
| Adenovirus tipo 2, cepa Manhattan | $10^{3.0}$ a $10^{5.0}$ DICT <sub>50%</sub> |

### Diluyente

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Agua inyectable estéril c.b.p | 1 mL |
|-------------------------------|------|

## 1. Indicaciones de uso

**Inmunovax<sup>®</sup> DPA<sub>2</sub>** está indicada para la inmunización activa y prevención de enfermedades causadas por parvovirus canino, distemper canino y adenovirus canino tipo 2.

## 2. Especie destino

Caninos.

## 3. Dosis y vía de administración

1 mL, vía subcutánea.

Agregar la totalidad del diluyente (1mL) al vial de la pastilla liofilizada y mezclar. Administrar inmediatamente después de reconstituido

**Inmunovax<sup>®</sup> DPA<sub>2</sub>** puede aplicarse desde las 6 semanas de edad, las características de sus inmunógenos le permiten estimular desde la primera vacunación la producción de anticuerpos específicos. Las revacunaciones deberán ser cada 15 días siguiendo el esquema que a criterio del médico veterinario se haya programado. Se recomiendan al menos tres vacunaciones de los antígenos virales que contiene **Inmunovax<sup>®</sup> DPA<sub>2</sub>** para lograr una protección estable y duradera. El médico veterinario podrá incluir las vacunas que a su criterio requiera cada paciente.

## 4. Reacciones adversas

La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas, antídoto: epinefrina y/o corticoides. Pueden aparecer efectos locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la vacunación y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

## 5. Seguridad

N/A.

## 6. Contraindicaciones

No aplicar a animales inmunodeprimidos, enfermos, ni en perros menores de 6 semanas de edad.

## 7. Advertencias y precauciones de uso

Aplíquese únicamente en animales sanos.

Una vez extraído el contenido, aplicar la totalidad del vial.

Deberá usarse una jeringa y aguja nueva para cada aplicación.

Tras la vacunación debe evitarse el contacto con potenciales fuentes de infección hasta 14 días después de la administración.

## 8. Tiempo o periodo de retiro

N/A.

## 9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 24 meses después de la fecha de fabricación.

## 10. Precauciones especiales de conservación:

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C.

Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa.

Conservar fuera del alcance de niños y animales domésticos.

## 11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos:

Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura, según la normativa vigente aplicable a su país.

## Presentación (es)

Blíster con 12 dosis de 1 mL