



Descripción del producto

Vacuna viral múltiple.
Su venta requiere receta médica.

Forma física o farmacéutica

Suspensión inyectable.

Fórmula

Contenido mínimo de título de cada fracción en 1 mL

Virus vivo modificado de Parvovirus canino Tipo-2b CPV-2, cepa Cornell	$10^{3.0}$ DICT 50%/mL
Virus inactivado de Coronavirus canino, cepa CCV TN449	$10^{3.0}$ DICT 50%/mL
Vehículo c.b.p	1 mL

1. Indicaciones de uso

Vacuna Parvo C está indicada para la inmunización activa y prevención de enfermedades causadas por parvovirus y coronavirus.

2. Especie destino

Caninos

3. Dosis y vía de administración

1 mL, vía subcutánea o intramuscular.

Se recomienda la vacunación con Vacuna Parvo-Corona a partir de las 6 semanas de edad. Revacunar cada 15 días hasta las 16 semanas o hasta concluir el esquema que a criterio del médico veterinario se haya programado.

4. Reacciones adversas

La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse, utilizar epinefrina y/o corticoides. Pueden aparecer efectos locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la vacunación y los mismos ceden por sí solos después de uno o dos días.

5. Seguridad

N/A.

6. Contraindicaciones

No aplicar a animales inmunodeprimidos, enfermos, ni en perros menores de 6 semanas de edad.

7. Advertencias y precauciones de uso

Aplicar únicamente en animales sanos. Una vez extraído el contenido, aplicar la totalidad del vial. Deberá usarse una jeringa y aguja nueva para cada aplicación. Tras la vacunación debe evitarse el contacto con potenciales fuentes de infección hasta 14 días después de la administración.

Agitar suavemente antes de usar.

8. Tiempo o periodo de retiro

N/A.

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 18 meses después de la fecha de fabricación.

10. Precauciones especiales de conservación

Conservar en refrigeración entre 2 °C y 8 °C. Este producto no debe congelarse.

Evite la exposición a la luz solar directa.

Conservar fuera del alcance de niños y animales domésticos.

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

Presentación (es)

Blíster con 24 dosis de 1 mL