

# One CG suspensión®

Número de registro Q-0104-206

## Descripción del producto

Antiparasitario de amplio espectro.

## Forma farmacéutica

Suspensión oral.

## Fórmula

### Cada mL contiene

|                |       |
|----------------|-------|
| Fenbendazol    | 55 mg |
| Toltrazuril    | 20 mg |
| Vehículo c.b.p | 1 mL  |



## 1. Indicaciones de uso

One CG suspensión está indicado en perros y gatos a partir de las 3 semanas para el control y tratamiento de parasitosis ocasionadas por coccidios (p. ej. *Cystoisospora* spp.) protozoarios (p. ej. *Giardia* spp.) y nematodos (*Toxocara* spp. *Ancylostoma* spp. *Toxascaris* spp. *Trichuris* spp.)

## 2. Especie destino.

Caninos y felinos.

## 3. Dosis y vía de administración.

En perros y gatos:

Para tratar coccidios y *Giardia* spp. 1 mL por cada kilogramo de peso (equivalente a fenbendazol 55 mg/kg, toltrazuril 20 mg/kg), una toma cada 24 horas durante 3 a 5 días; repetir el tratamiento a los 7 días.

Para tratar nematodos 1 mL por cada kilogramo de peso (equivalente a fenbendazol 55 mg/kg, toltrazuril 20 mg/kg), una toma cada 24 horas durante 3 días; repetir el tratamiento a los 14 o 21 días para el caso de Áscaris y *Ancylostoma*. Para *Trichuris vulpis* repetir a los 30 y 60 días.

| Nematodos                      | Segunda toma  |
|--------------------------------|---------------|
| <i>Ancylostoma caninum</i>     | 14 - 21 días  |
| <i>Ancylostoma braziliense</i> | 14- 21 días   |
| <i>Ancylostoma tubaeforme</i>  | 14- 21 días   |
| <i>Uncinaria stenocephala</i>  | 14- 21 días   |
| <i>Trichuris vulpis</i>        | 11-12 semanas |
| <i>Toxocara canis</i>          | 21 días       |
| <i>Toxascaris leonina</i>      | 8-13 semanas  |

| Protozoarios                    | Segunda toma |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Giardia lamblia</i>          | 4-16 días    |
| <i>Eimeria spp</i>              | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora ohioensi</i>   | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora neorivolta</i> | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora burrowsi</i>   | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora felis</i>      | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora rivolta</i>    | 4-11 días    |
| <i>Hammondia heydorni</i>       | 5-9 días     |
| <i>Hepatozoon spp</i>           | 4-6 semanas  |

#### 4. Mecanismo de acción

Nematodos y giardias son eliminados mediante la acción del fenbendazol que inhibe mecanismos de la captación y asimilación de glucosa lo que provoca la disminución de energía en el parásito produciéndose la muerte de este. Además, al unirse a tubulinas inhibe la polimerización de microtúbulos, unidades estructurales esenciales de varios orgánulos necesarios para numerosos procesos celulares que incluyen la mitosis, el ensamblaje de proteínas, así como metabolismo energético.

Toltrazuril induce cambios en estructuras como retículo endoplasmático y aparato de Golgi, así como anomalías en el espacio perinuclear que impiden la división celular y provocan la reducción de enzimas que intervienen en la cadena respiratoria de los coccidios.

#### 5. Reacciones adversas

Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, secundarias a la liberación de antígenos de los parásitos muertos. Pueden presentarse signos gastrointestinales, anorexia, vómitos, letargia y diarrea.

Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina y/o corticoides aunado a una terapia de fluidos de soporte

#### 6. Seguridad

Cada una de las sales incluidas en el producto tiene un amplio margen de seguridad que va desde 40 a 500 veces la dosis recomendada.

El producto no tiene antídoto específico por lo cual se recomienda aplicar tratamiento sintomático para corregir los signos clínicos.

#### 7. Contraindicaciones

No administrar en hembras gestantes.

## 8. Advertencias y precauciones de uso

No administrar en cachorros menores de 3 semanas.

Administrar en conjunto con el alimento.

Se recomienda que todos los perros y gatos que convivan en el mismo hábitat deben recibir tratamiento desparasitante al mismo tiempo.

Agitar el producto antes de usar. Lávese las manos después de haber medicado al paciente. Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos .

## 9. Tiempo de retiro

No aplica al ser un producto destinado para animales de compañía.

## 10. Interacciones con otros medicamentos

N/A

## 11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 24 meses a partir de su fecha de elaboración .

## 12. Precauciones especiales de conservación

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.

Protéjase de la luz solar directa .

## 13. Precauciones especiales de eliminación de envases y residuos

Una vez utilizado el producto deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

## Presentación (es)

Frasco con 30 mL.