

# One Suspensión®

Número de registro Q-0104-205

## Descripción del producto

Antiparasitario de amplio espectro.

## Forma farmacéutica

Suspensión oral.

## Fórmula

### Cada 1 mL contiene

|                |       |
|----------------|-------|
| Fenbendazol    | 55 mg |
| Toltrazuril    | 20 mg |
| Prazicuantel   | 10 mg |
| Vehículo c.b.p | 1 ml  |



## 1. Indicaciones de uso

**One® suspensión** está indicado en perros y gatos a partir de las 3 semanas de edad para el tratamiento de parasitosis ocasionadas por coccidios (*Cystoisospora* spp.), protozoarios (*Giardia* spp.), nematodos (*Toxocara* spp., *Ancylostoma* spp., *Toxocaris* spp. *Trichuris* spp.) y Cestodos (*Dipylidium* spp., *Taenia* spp, *Equinococcus granulosus*).

## 2. Especie destino.

Perros y gatos

## 3. Dosis y vía de administración.

Para tratar coccidios y *Giardia* spp: 1 mL por cada kilogramo de peso (equivalente a fenbendazol 55 mg/kg, toltrazuril 20 mg/kg prazicuantel 10 mg/kg), una toma cada 24 horas durante 5 días; repetir el tratamiento a los 14 días.

Para tratar nematodos y cestodos: 1 ml por cada kilogramo de peso (equivalente a fenbendazol 55 mg/kg, toltrazuril 20 mg/kg prazicuantel 10 mg/kg), una toma cada 24 horas durante 3 días; para *Áscaris*, *Ancylostoma* y *Dipylidium* repetir el tratamiento a los 14 o 21 días. Para *Trichuris vulpis* repetir a los 30 y 60 días.

Vía de administración: Oral

| Nematodos                      | Segunda toma  |
|--------------------------------|---------------|
| <i>Ancylostoma caninum</i>     | 14 - 21 días  |
| <i>Ancylostoma braziliense</i> | 14- 21 días   |
| <i>Ancylostoma tubaeforme</i>  | 14- 21 días   |
| <i>Uncinaria stenocephala</i>  | 14- 21 días   |
| <i>Trichuris vulpis</i>        | 11-12 semanas |
| <i>Toxocara canis</i>          | 21 días       |
| <i>Toxascaris leonina</i>      | 8-13 semanas  |

| Cestodos                       | Segunda toma |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Dipylidium caninum</i>      | 21 días      |
| <i>Echinococcus granulosus</i> | 6 semanas    |
| <i>Taenia spp</i>              | 4-10 semanas |
| <i>Diphylobothrium latum</i>   | 5-6 semanas  |
| <i>Spirometra mansonoides</i>  | 2-4 semanas  |
| <i>Alaria spp</i>              | 3-4 semanas  |

| Protozoarios                    | Segunda toma |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Giardia lamblia</i>          | 4-16 días    |
| <i>Eimeria spp</i>              | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora ohioensi</i>   | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora neorivolta</i> | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora burrowsi</i>   | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora felis</i>      | 4-11 días    |
| <i>Cystoisospora rivolta</i>    | 4-11 días    |
| <i>Hammondia heydorni</i>       | 5-9 días     |
| <i>Hepatozoon spp</i>           | 4-6 semanas  |

#### 4. Mecanismo de acción

Los nematodos y la *Giardia* spp. son eliminados mediante la acción del fenbendazol que inhibe mecanismos de la captación y asimilación de glucosa lo que provoca la disminución de energía en el parásito produciéndose la muerte de este. Además, al unirse a tubulinas inhibe la polimerización de microtúbulos, unidades estructurales esenciales de varios orgánulos necesarios para numerosos procesos celulares que incluyen la mitosis, el ensamblaje de proteínas, así como el metabolismo energético.

El Prazicuantel por su lado tiene acción sobre cestodos afectando la membrana tegumentaria y modificando procesos metabólicos que generan contracciones musculares que disminuyen la capacidad de los parásitos planos de contraerse o relajarse lo que los lleva a la muerte debido a la incapacidad de alimentarse.

Toltrazuril induce cambios en estructuras como retículo endoplasmático y aparato de Golgi, así como anomalías en el espacio perinuclear que impiden la división celular y provocan la reducción de enzimas que intervienen en la cadena respiratoria de los coccidios

#### 5. Reacciones adversas

Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, secundarias a la liberación de antígenos de los parásitos muertos. Pueden presentarse signos gastrointestinales, anorexia, letargia y diarrea.

Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina y/o corticoides aunado a una terapia de fluidos de soporte

## 6. Seguridad

Cada una de las sales incluidas en el producto tiene un amplio margen de seguridad que va desde 40 a 500 veces la dosis recomendada.

En el caso de existir sobredosificación pueden observar signos como: anorexia, vómito, salivación, diarrea y depresión.

El producto no tiene antídoto específico por lo cual se recomienda aplicar tratamiento sintomático para corregir los signos clínicos.

## 7. Contraindicaciones

No administrar en cachorros menores a 3 semanas de edad.

No administrar en animales gestantes ni lactantes.

## 8. Advertencias y precauciones de uso

Agitar el producto antes de usar.

Administre el producto junto con el alimento.

La administración de cualquier fármaco puede ocasionar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse utilizar epinefrina y/o corticoides.

Se recomienda que todos los perros y gatos que convivan en el mismo hábitat reciban tratamiento desparasitante al mismo tiempo.

Lavese las manos .

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos .

Debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de epilepsia.

## 9. Tiempo de retiro

No aplica por ser un producto destinado para animales de compañía.

## 10. Interacciones con otros medicamentos

No administrar juntamente con AINE's.

La utilización concomitante de inductores de citocromo p450 como por ejemplo fármacos antiepilépticos (fenitoina, fenobarbital, y carbamacepina), dexametasona, rifampicina, pueden disminuir los niveles plasmáticos de praziquantel. Por tanto, el uso concomitante debe evitarse. Fármacos inhibidores del citocromo p450, como cimetidina, ketoconazol, itraconazol, eritromicina pueden aumentar los niveles plasmáticos de praziquantel .

## 11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 24 meses a partir de su fecha de elaboración .

## 12. Precauciones especiales de conservación

Conservar en un lugar fresco y seco.

Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.

Proteger de la luz solar directa .

## 13. Precauciones especiales de eliminación de envases y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región.

## Presentación (es)

Frasco con 30 y 60 mL.