

Descripción del producto

Antiparasitario oral de amplio espectro

Forma farmacéutica

Tabletas

Fórmula

Cada tableta contiene

Fenbendazol	500 mg
Prazicuantel	50 mg
Toltrazuril	150 mg
Excipiente c.b.p	1 tableta



1. Indicaciones de uso

One® Indicado en perros como antiparasitario oral de amplio espectro, para el control y tratamiento de parasitosis ocasionadas por protozoarios, cestodos y nemátodos.

2. Especie destino

Perros.

3. Dosis y vía de administración

Perros: 1 tableta por cada 10 kilogramos de peso (Fenbendazol 50 mg/kg, Prazicuantel 5 mg/kg y Toltrazuril 15 mg/kg).

Se recomienda una segunda toma 21 días después para cortar el ciclo biológico de los parásitos.

Nematodos, giardias y coccidias, administrar una dosis cada 24 horas durante 3 días.

Vía de administración: Oral

Nematodos	Segunda toma
<i>Ancylostoma caninum</i>	14 - 21 días
<i>Ancylostoma braziliense</i>	14- 21 días
<i>Ancylostoma tubaeforme</i>	14- 21 días
<i>Uncinaria stenocephala</i>	14- 21 días
<i>Trichuris vulpis</i>	11-12 semanas
<i>Toxocara canis</i>	21 días
<i>Toxascaris leonina</i>	8-13 semanas

Cestodos	Segunda toma
<i>Dipylidium caninum</i>	21 días
<i>Echinococcus granulosus</i>	6 semanas
<i>Taenia spp</i>	4-10 semanas
<i>Diphylobothrium latum</i>	5-6 semanas
<i>Spirometra mansonioides</i>	2-4 semanas
<i>Alaria spp</i>	3-4 semanas

Protozoarios	Segunda toma
<i>Giardia lamblia</i>	4-16 días
<i>Eimeria spp</i>	4-11 días
<i>Cystoisospora ohioensi</i>	4-11 días
<i>Cystoisospora neorivolta</i>	4-11 días
<i>Cystoisospora burrowsi</i>	4-11 días
<i>Cystoisospora felis</i>	4-11 días
<i>Cystoisospora rivolta</i>	4-11 días
<i>Hammondia heydorni</i>	5-9 días
<i>Hepatozoon spp</i>	4-6 semanas

4. Mecanismo de acción

Nematodos y giardias son eliminados mediante la acción del Fenbendazol que inhibe mecanismos de la captación y asimilación de glucosa lo que provoca la disminución de energía en el parásito produciéndose la muerte de este. Además, al unirse a tubulinas inhibe la polimerización de microtúbulos, unidades estructurales esenciales de varios orgánulos necesarios para numerosos procesos celulares que incluyen la mitosis, el ensamblaje de proteínas, así como metabolismo energético.

El Prazicuantel por su lado tiene acción sobre cestodos afectando la membrana tegumentaria y modificando procesos metabólicos que generan contracciones musculares que disminuyen la capacidad de los parásitos planos de contraerse o relajarse lo que los lleva a la muerte debido a la incapacidad de alimentarse.

Toltrazuril induce cambios en estructuras como retículo endoplasmático y aparato de Golgi, así como anomalías en el espacio perinuclear que impiden la división celular y provocan la reducción de enzimas que intervienen en la cadena respiratoria de los coccidios.

5. Reacciones adversas

Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, secundarias a la liberación de antígenos de los parásitos muertos. Pueden presentarse signos gastrointestinales, anorexia, vómitos, letargia y diarrea.

Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina y/o corticoides aunado a una terapia de fluidos de soporte.

6. Seguridad

Cada una de las sales incluidas en el producto tiene un amplio margen de seguridad que va desde 40 a 500 veces la dosis recomendada.

En el caso de existir sobredosificación pueden observar signos como: anorexia, vómito, salivación, diarrea y depresión.

El producto no tiene antídoto específico por lo cual se recomienda aplicar tratamiento sintomático para corregir los signos clínicos.

7. Contraindicaciones

No administrar en hembras gestantes ni lactantes.

8. Advertencias y precauciones de uso

Administrar en cachorros a partir de las 4 semanas de edad.

No administrar en animales gestantes ni lactantes.

Lávese las manos después de haber medicado al paciente.

Conservar fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de anafilaxia administrar antihistamínicos.

9. Tiempo de retiro

N/A

10. Interacciones con otros medicamentos

No administrar juntamente con AINE's.

La utilización concomitante de inductores de citocromo p450 como por ejemplo fármacos antiepilépticos (fenitoina, fenobarbital, y carbamacepina), dexametasona, rifampicina, pueden disminuir los niveles plasmáticos de praziquantel. Por tanto, el uso concomitante debe evitarse. Fármacos inhibidores del citocromo p450, como cimetidina, ketoconazol, itraconazol, eritromicina pueden aumentar los niveles plasmáticos de praziquantel.

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

Periodo de validez una vez acondicionado para la venta: 24 meses a partir de su fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envases y residuos

Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura.

Presentación (es)

Caja con 30 y 60 tabletas.