

Descripción del producto

Inmunoestimulante.

Forma física o farmacéutica

Suspensión inyectable

Fórmula

Cada 100 mL contienen

Caseína	3.5 g
Lactosa	5.0 g
Vehículo c.b.p	100 mL



1. Indicaciones de uso

Proteizoo® Plus es un agente profiláctico primario que puede ser usado con el fin de incrementar la capacidad defensiva general del organismo. Estimula mecanismos propios de la inmunidad innata activando la primera línea de defensa celular por lo que está indicado como coadyuvante en el control de infecciones de etiología bacteriana, viral y/o parasitaria en conjunto con el tratamiento de elección. Potencializa la eficacia de los programas de vacunación al mejorar el reconocimiento antigénico y contribuye en la prevención del establecimiento de microorganismos patógenos en animales que serán sometidos a procesos de inmunosupresión terapéutica o por estrés como pensión, exhibiciones, viajes o entrenamiento.

2. Especie destino

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves (reproductoras, pollo de engorda y aves de corral).

3. Dosis y vía de administración

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea

Bovinos y equinos: 1.4 mg/kg (2 mL/50 kg)

Porcinos: 2 mg/kg (3 mL/50 kg)

Ovinos y caprinos: 4.5-6.3 mg/kg (1.3 a 1.8 mL/10 kg)

Aves (reproductoras, pollo de engorda y aves de corral): 14 mg/kg (0.4 mL/kg).

Una dosis cada 72 h hasta completar cinco aplicaciones hasta la desaparición de los signos o a criterio del médico veterinario.

4. Mecanismo de acción

Proteizoo® Plus logra estimular la respuesta inmune inespecífica de los animales, sin que la actividad de las células estimuladas vaya dirigida hacia un antígeno determinado. Se dividen en 3 tipos, según su acción: Los que actúan sobre el sistema inmune normal (tipo I), así como los que lo hacen sobre el sistema inmune inmunodeprimido (tipo II) y sobre el sistema inmune funcionalmente normal e inmunodeprimido (tipo III).

La caseína y la lactosa son moléculas que al ser administradas por vía parenteral provocan una respuesta inflamatoria que estimula la producción de células de defensa y la expresión de factores inmunes como interferón, citocinas y quimiocinas.

5. Reacciones adversas

N/A

6. Seguridad

Como cualquier fármaco puede causar reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad. Antídoto: epinefrina.

7. Contraindicaciones

N/A

8. Advertencias y precauciones de uso

No administrar más de 10 mL por sitio de aplicación.

En caso de reacción anafiláctica aplicar epinefrina y terapia de soporte.

No se deje alcance de los niños y animales domésticos.

No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

9. Tiempo de retiro

Este producto no tiene tiempo de retiro en leche y carne.

10. Interacciones con otros medicamentos

N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Guardar a temperatura entre 10 °C a 30 ° C.

Protéjase de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envases y residuos

Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes de acuerdo con la normativa vigente.

Presentación (es)

Frasco con 20 mL, 100 mL y 250 mL.