

CEFAMASTER LAC

Registro SAGARPA Q-0104-179



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Antibiótico de amplio espectro

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA

Infusión intramamaria

FÓRMULA

Cada jeringa contiene:

Cefalexina base.....	100 mg
Neomicina.....	100 mg
Prednisolona.....	10 mg
Vehículo c.b.p.....	10 MI



1. Indicaciones de uso

Cefamaster Lac es una infusión Intramamaria con una combinación sinérgica de antibióticos de amplio espectro y antiinflamatorio, para el tratamiento de la mastitis durante el período de lactación en bovinos y caprinos, causada por microorganismos sensibles a la cefalexina y a la neomicina.

2. Especie destino

Bovinos y caprinos.

3. Posología y vía de administración

Aplique masaje en forma ascendente comenzando de la punta del pezón hacia la base del mismo para una mejor dispersión del producto.

Aplicar el contenido completo de una jeringa en cada uno de los cuartos (bovinos) o medios (caprinos) afectados cada 12 horas después del ordeño durante 2 a 3 días o hasta la recuperación completa del animal.

Vía de administración intramamaria.

4. Mecanismo de acción

El uso de la combinación de cefalexina y neomicina, se debe a que la neomicina pertenece al grupo de los aminoglucósidos; que tiene acción contra bacterias gramnegativas y algunos grampositivos causantes de mastitis, incluyendo *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp, *E. coli*, *Klebsiella* sp, principalmente. Es bien reconocido que la neomicina aplicada por sí sola vía Intramamaria tiene una baja efectividad, sin embargo en combinación con la cefalexina que tiene una acción buena en glándula mamaria y que pertenece a la familia de las cefalosporinas. La cefalexina tiene una notable eficacia en el tratamiento y prevención de mastitis por grampositivos como *Staphylococcus aureus*, *S. intermedius* y *S. epidermidis*.

5. Reacciones adversas

N/A

6. Seguridad

N/D

7. Contraindicaciones

N/A

8. Advertencias y precauciones de uso

Contraindicado en animales con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

9. Tiempo o periodo de retiro

No destinar leche para el consumo humano hasta 2 días después de la última aplicación.

10. Interacciones con otros medicamentos

N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

2 años a partir de la fecha de elaboración.

12. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C.
Protéjase de la luz solar directa.

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN(ES) FARMACÉUTICA(S)

Caja con 20 jeringas de 10 mL c/u.