



BACTERINA CONTRA PASTEURELOSIS

Registro SAGARPA B-0104-102

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bacterina inactivada

FORMA FÍSICA

Suspensión inyectable

FÓRMULA

Pasteurella multocida Tipos A y D

Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica A1)



1. Indicaciones de uso

Bacterina indicada para la prevención de la pasteurelisis.

2. Especie destino

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

3. Dosis y vía de administración

Bovinos, equinos y porcinos 5 mL, ovinos y caprinos 2.5 mL. Vía Intramuscular o subcutánea.

4. Reacciones adversas

Pueden aparecer reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por si solos después de uno o dos días.

5. Seguridad

La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el uso de epinefrina y/o antihistamínicos.

6. Contraindicaciones

No administrar en animales enfermos o inmunocomprometidos.

7. Advertencias y precauciones de uso

Aplíquese únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

8. Tiempo o periodo de retiro

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final

18 meses a partir de la fecha de elaboración.

10. Precauciones especiales de conservación

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 4°C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN (ES)

10 ds (50 ml) y 50 ds (250 ml)